



IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA (KI).....

PESELDATA.....

**FORMULARZ ZGODY
NA WYKONANIE ZABIEGU OPERACYJNEGO
WYCIĘCIE GUZKÓW KRWAWNICZYCH – HEMOROIDÓW**

I Nazwa procedury medycznej lub zabiegu

Wycięcie guzków krwawniczych – hemoroidów

II Opis choroby będącej powodem zgłoszenia się pacjenta

Rozpoznano u Pana/Pani* chorobę hemoroidalną (guzki krwawnicze, hemoroidy). Hemoroidy są to poszerzone sploty żyłne okolicy odbytu, przyjmujące najczęściej postać guzków. Bezpośrednią przyczyną powstawania hemoroidów jest utrudniony odpływ krwi żyłnej ze splotu odbytniczego, prowadzący do jego poszerzenia. Przyczyną powstawania guzków krwawniczych odbytu są głównie przewlekłe zaparcia, siedzący tryb życia, ciąża. Najczęstsze objawy tej choroby to: krwawienie świeżą, jasnoczerwoną krwią, pojawiającą się na powierzchni stolca. W okolicach odbytu mogą pojawić się łatwo wyczuwalne, czasem bolesne guzki.

III Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej lub operacji

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu krótkotrwałym dożylnym lub podpajęczynówkowym. Dokładnych informacji na temat znieczulenia i możliwych jego powikłań udzieli lekarz anestezjolog podczas badania. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia operacyjnego guzków krwawniczych są operacje sposobem Milligana - Morgana, Fergusona lub Parksa. Polegają ona na wypreparowaniu i wycięciu chorobowo zmienionych guzków. Rany po wycięciu hemoroidów, w zależności od metody zaszywa się całkowicie, częściowo albo w ogóle.

IV Opis innych dostępnych metod leczenia

Istnieje również możliwość wycięcia hemoroidów przy użyciu jednorazowego urządzenia- staplera, które częściowo wycina wypadającą z odbytu błonę śluzową i podwiesza powiększone hemoroidy w odbytnicy wykonując jednocześnie szew mechaniczny w miejscu wycięcia. W ten sposób uzyskuje się częściowe przecięcie naczyń doprowadzających krew do hemoroidów i ich stopniowe zanikanie (jest to tzw. Metoda Longo).

Inne metody stosowane w leczeniu choroby hemoroidalnej to:

- leczenie zachowawcze z zastosowaniem różnych preparatów o działaniu przeciwzapalnym, obkurczającym błonę śluzową (przeciwobrzękowym), przeciwbólowym, przeciwświądowym i zmieniających napływ krwi do miednicy mniejszej,

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA (KI).....

PESELDATA.....

- metody zabiegowe: zakładanie gumowych podwiązek, krioterapia (zamrażanie), waporyzacja (odparowywanie) i podkłuwanie naczyń doprowadzających krew do splotów hemoroidalnych (metoda DGHL).

V Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub Operacją

Zabieg operacyjny nie przebiega identycznie u każdego chorego. Zależy to od wielu czynników. Między innymi od wielkości guzków krwawniczych, od tego czy operacja jest przeprowadzana pierwszy raz czy mamy do czynienia z nawrotem choroby. Różne, trudne do przewidzenia trudności techniczne występujące podczas zabiegu operacyjnego mogą spowodować, że pomimo starań lekarzy podczas operacji, jak i po jej zakończeniu może dojść do wystąpienia powikłań. Do powikłań tych należą:

- ból pooperacyjny,
- krwawienia śródoperacyjne i pooperacyjne, niekiedy wymagające przetoczenia krwi lub ponownej operacji;
- przedłużone krwawienie, po 7-16 dniach od zabiegu;
- tworzenie się zakrzepów w układzie żylnym, co zagraża: zakrzepicą naczyń kończyn dolnych, naczyń jamy brzusznej, a w przypadku oderwania zakrzepu zatorom tętnicy płucnej, lub mikrozatorowością płuc;
- powstawanie zatorów tętnic, które mogą spowodować między innymi zawał serca, udar mózgu, lub zamknięcie innych tętnic obwodowych;
- powikłania ze strony układu krążenia – nasilenie niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego;
- niekiedy mogą wystąpić uszkodzenia lub oparzenia skóry przez środki dezynfekujące lub prąd elektryczny stosowane podczas zabiegu;
- alergie na leki stosowane w okresie okołoperacyjnym – szczególnie leki stosowane podczas znieczulenia, antybiotyki oraz środki przeciwbólowe;
- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C (tzw. żółtaczką zakaźną) lub wirusem HIV;
- zakażenia rany
- obrzęk okolicy odbytu
- zakrzepica przyodbytowego splotu żylnego
- zakażenie układu moczowego
- uciążliwe krótkotrwałe zaparcia
- trudności z oddaniem moczu
- powikłania związane z zakładaniem i obecnością wkłuc dożylnych (miejscowa infekcja, krwaki, obrzęk, zakażenie wkłucia)
- nietrzymanie stolca
- zwężenie odbytu,
- zaburzenia oddawania stolca lub gazów
- szczelina odbytu
- nawrót hemoroidów
- nietrzymanie stolca



IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA (KI).....

PESELDATA.....

VI Opis zwiększonego ryzyka powikłań w związku ze stanem zdrowia pacjenta

(Miejsce w formularzu do indywidualnego wypełnienia przez lekarza opiekującego się pacjentem)

.....
.....
.....

VII Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Po operacji będzie Pani/Pan odczuwać dolegliwości bólowe związane z raną pooperacyjną, mogą także wystąpić nudności i wymioty. Najczęściej pacjent wypisywany jest ze szpitala po kilku godzinach od operacji lub w 1-2 dobie pooperacyjnej. Dalsza opieka pooperacyjna sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu pooperacyjnego. Powinniście Państwo być świadomi, że operacja jest zawsze związana z ryzykiem powikłań, zarówno wymienionych powyżej, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia . Wystąpienie powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może być także przyczyną śmierci. Nie można zatem z całą pewnością oczekiwać, że podczas leczenia operacyjnego lub po nim nie dojdzie do ich wystąpienia.

VIII Opis możliwych następstw rezygnacji z proponowanego leczenia

Rezygnacja z proponowanego leczenia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przewlekłego krwawienia, a u części chorych nawet z krwotokiem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przewlekające się krwawienia z hemoroidów mogą z czasem doprowadzić do niedokrwistości. Nie leczone hemoroidy mogą ulec wypadnięciu i zakrzepicy, co wiąże się z silnym, nieustępującym bólem okolicy odbytu, dużym obrzękiem okolicy około odbytniczej i koniecznością operacją w trybie pilnym. Ponadto wypadanie hemoroidów i ich pozostawanie na zewnątrz może doprowadzić do przewlekłe utrzymujących się stanów zapalnych okolicy odbytu ograniczających w znacznym stopniu prawidłowe funkcjonowanie społeczno – zawodowe.

IX Oświadczenie pacjenta

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam* się z treścią niniejszego formularza oraz zostałem/łam* poinformowany/na* przez o proponowanym rodzaju leczenia. Oświadczam, iż miałem/łam* możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego leczenia i otrzymałem/łam* na nie

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA (KI).....

PESELDATA.....

odpowieź. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące proponowanego leczenia prosimy o ich wpisanie poniżej:

.....
.....
.....

Data i podpis Pacjenta/ki

Data i podpis Przedstawiciela ustawowego.....

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przeprowadzenie proponowanej operacji

Data i podpis Pacjenta/ki

Data i podpis Przedstawiciela ustawowego.....

Nie wyrażam zgody na przeprowadzenie proponowanej operacji:

Data i podpis Pacjenta/ki

Data i podpis Przedstawiciela ustawowego.....

(Uzasadnienie przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie proponowanej procedury medycznej /zabiegu)

.....
.....
.....

Oświadczam, że podczas wywiadu lekarskiego i badania nie zataiłem/łam* istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia , badań, oraz przebytych chorób.

Data i podpis Pacjenta/ki.....

Data i podpis Przedstawiciela ustawowego.....

Data i podpis lekarza udzielającego informacji o proponowanej metodzie leczenia:

.....